NEWS RELEASE

June 29, 2021

Contact: McKenzie Hatch

Environmental Health Specialist

(308) 385-5175

البعوض ، غرب النيل ، لا يزال يمثل تهديدًا على الرغم من الظروف الجافة

غراند آيلاند - حتى مع ظروف الجفاف ، تحث إدارة الصحة بالمنطقة المركزية السكان على اتخاذ الاحتياطات ضد البعوض وفيروس غرب النيل (WNV).

"أعداد البعوض منخفضة إلى حد ما في هذا الوقت بسبب الظروف الجافة" يقول ماكنزي هاتش ، أخصائي الصحة البيئية في CDHD. "ومع ذلك ، يمكن أن يتغير ذلك بسرعة ويجب توخي الحذر في الهواء الطلق عند وجود البعوض".

أسهل وأفضل طريقة لتجنب WNV هي منع لدغات البعوض. تتضمن النصائح:

- عندما تكون بالخارج ، استخدم طارد الحشرات الذي يحتوي على مادة DEET.
- يكون العديد من البعوض أكثر نشاطًا عند الغسق والفجر. كن حذرًا جدًا خلال تلك الأوقات.
- تأكد من وجود شاشات جيدة على النوافذ والأبواب لإبعاد البعوض.
- تخلص من مواقع تكاثر البعوض عن طريق إفراغ المياه الراكدة من أواني الزهور والدلاء والبراميل وأطباق الحيوانات الأليفة وحمامات الطيور وأحواض خوض الأطفال وأي مكان آخر يمكن أن تتجمع فيه المياه.

لقاح فيروس غرب النيل للخيول.

من أفضل الطرق لخفض WNV لأصحاب الخيول هو اللقاح الذي يمنع انتقال المرض من البعوض إلى الخيول. يجب على مالكي الخيول استشارة الأطباء البيطريين فيما يتعلق باستخدامها. لا توجد قيمة لقاحات اللقاح إذا لم يتم إعطاؤها قبل التعرض للمرض. تتطلب اللقاحات جرعتين ، يتم تناولهما من ثلاثة إلى ستة أسابيع ، ولا تتطور الحماية الكاملة إلا بعد أربعة إلى ستة أسابيع من الجرعة الثانية. في بعض الأحيان يوصى

NEWS RELEASE

بثالث. يوصى باستخدام المعززات ، لكن التوصيات تختلف وتعتمد على انتشار البعوض في المكان الذي تعيش فيه.

قد يستغرق الأمر من 7 إلى 12 أسبوعًا حتى يطور الحصان أقصى مقاومة للعدوى.
تشمل العلامات الأكثر شيوعًا لعدوى WNV في الخيول التعثر ، وعدم التناسق ، وضعف الأطراف ، والشلل الجزئي ، وارتعاش العضلات ، وفي بعض الحالات ، الموت. كما هو الحال دائمًا ، استشر طبيبك البيطري بشأن تطعيم الخيول.

لمزيد من المعلومات حول فيروس غرب النيل وكيفية الوقاية منه ، يرجى الاتصال بإدارة صحة المنطقة المركزية على